

comrade

Toelatingsnummer: 15047 N

Productgroep: fungicide

Aard van het preparaat: suspensie concentraat

Werkzame stof: cyproconazol en azoxystrobin

Gehalte: 80 g/L en 200 g/L



SIGNAALWOORD
WAARSCHUWING

Gevenaanduidingen

H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

EUI401-Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

H302-Schadelijk bij inslikken.

H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Voorzorgsmaatregelen

P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273-Voorkom lozing in het milieu.

P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.

P302 + P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen.

P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301 + P312-NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts/... raadplegen.

SP 1-Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar door hem geen controle over het gebruik en de opslag kan worden uitgeoefend, kan hij niet de aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing.

Toelatingshouder:

Sharda Cropchem Espana S.L.
Edificio Alalayas Business Center
Carril Condomina nº 3, Planta 12
30006 Murcia
Spanje.
Tel: 0034 868127589
Fax: 0034 868127588
www.shardacropchem.com

INHOUD: xx L e
CHARGENUMMER: zie verpakking
Vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking
bewaren.
Houdbaarheid: Vanaf de datum van productie 2 jaar
bij kamertemperatuur.
De verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



Sharda Cropchem

5 L

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Wintertarwe	Bruine roest ¹ , Bladvlekkenziekte ² Kafjesbruin ³ Gele roest ⁴	1,0 L/ha	2	21	BBCH 59 (einde aarvorming)
Wintergerst	Dwergroest ⁵	1,0 L/ha	2	21	BBCH 51 (begin aarvorming)
Winterrogge	Bruine roest ¹	1,0 L/ha	2	21	BBCH 59 (einde aarvorming)
Triticale	Bruine roest ¹	1,0 L/ha	2	21	BBCH 59 (einde aarvorming)
Zomertarwe	Bruine roest ¹ , Bladvlekkenziekte ² Kafjesbruin ³ Gele roest ⁴	1,0 L/ha	2	21	BBCH 59 (einde aarvorming)
Zomergerst	Dwergroest ⁵	1,0 L/ha	2	21	BBCH 51 (begin aarvorming)
Zomerrogge	Bruine roest ¹	1,0 L/ha	2	21	BBCH 59 (einde aarvorming)

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

- 1 Bruine roest (*Puccinia recondita*)
- 2 Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici*)
- 3 Kafjesbruin (*Septoria nodorum*)
- 4 Gele roest (*Puccinia striiformis*)
- 5 Dwergroest (*Puccinia hordei*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

In verband met mogelijke residuen in volggewassen mogen na gebruik van COMRADE in het hetzelfde teeltseizoen geen bladgewassen geteeld worden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof azoxystrobin en cyproconazole. Azoxystrobin behoort tot de Strobilurines. De Frac code is 11. Cyproconazole behoort tot de Triazolen. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.